

抜歯時の経口抗菌薬

リスク因子

あり

SSIリスク因子
(糖尿病、肥満、ステロイド、免疫抑制剤の併用)

ペニシリンアレルギーのある場合

感染性心内膜炎の既往患者、人工弁置換患者、先天性心疾患等

なし 予防的抗菌薬投与不要

アモキシシリン

用法用量
成人 1日3回 1回250mg
1日3回 小児10-15mg/kg/回

投与期間 単回~48時間以内の使用

薬価
250mg錠
250mgカプセル 10.1円
細粒10% 9.8円

クリンダマイシン

用法用量
1日3-4回 成人1回150mg
1日3回 小児1回5mg/kg

投与期間 単回~48時間以内の使用

薬価
ダラシнкаプセル75mg 17.6円
ダラシнкаプセル150mg 23.8円

クラリスロマイシン

用法用量
1日2回 成人1回200mg
1日2回 小児7.5mg/kg/日

投与期間 単回~48時間以内の使用

備考 相互作用多いため注意

薬価
200mg錠 19.2~25.3円
50mg錠 12.3円
ドライシロップ10% 29.2~57.9円

アモキシシリン

用法用量 2g/回術前1時間前

ペニシリンアレルギーのある場合

クリンダマイシン 600mg/回術前1時間前

クラリスロマイシン 400mg/回術前1時間前